

**Club des ornithologues de Québec  
Conférence dans Charlevoix, 9 mars 2019**

**Les bienfaits d'avoir les oiseaux de Charlevoix dans nos jardins  
et comment les attirer**

**Document complémentaire: 73 oiseaux hivernants et mangeoires**

**Objet :** Pour information en général et comme complément à la conférence du 9 mars.

**Remarques :**

- a) Ce texte a été utilisé à l'occasion depuis 2012, avec changements divers dans la présentation, selon le contexte particulier. Quand il semble manquer une espèce dans une section, c'est qu'elle est mentionnée dans une autre section.
- b) La conférence s'attache surtout aux oiseaux qui visitent les jardins au printemps, à l'été et à l'automne. Ce texte est une aide si l'on veut aussi avoir des oiseaux chez soi en hiver, de même que s'il est souhaité d'apprendre où en observer dans leurs milieux naturels en hiver.

Norbert Lacroix  
Mars 2019.

**Oiseaux hivernants et quelques suggestions pour les mangeoires**

*Par Norbert Lacroix*

**NOTE 1 :** le terme *hivernant* s'applique à la période du 1<sup>er</sup> décembre au 31 mars, approximativement. Les retardataires qui sont encore sur place lors des premiers jours de décembre ne sont pas comptés comme hivernants.

**NOTE 2 :** pour attirer le mieux possible des oiseaux aux mangeoires, il est de mise de leur offrir leur nourriture préférée, ce qui est indiqué entre crochets à côté du nom de l'oiseau, lorsqu'il s'agit d'une espèce qui fréquente les postes d'alimentation.

**NOTE 3 :** les types de mangeoires sont :

- au sol,
- un plateau,
- un plateau abrité,
- une mangeoire à débit contrôlé,
- un silo,
- un présentoir à suif,
- un présentoir à beurre d'arachides,

- une mangeoire pour les noix et les arachides.

***Références suggérées :***

Jean Paquin, *Les oiseaux aux mangeoires*, Éditions Michel Quintin, 2002.

Suzanne Brûlotte, *Observer les oiseaux avec les enfants*, Broquet Inc., 2008.

**Oiseaux observés en général en hiver**

*Fleuve et plans d'eau (12)*

Guillemot à miroir (Charlevoix et Bas-Saint-Laurent, sur le fleuve)  
 Grand Harle (sur le fleuve)  
 Garrot à œil d'or (sur le fleuve)  
 Garrot d'Islande (sur le fleuve)  
 Canard noir (plans d'eau peu profonds et libres de glace)  
 Canard colvert (plans d'eau peu profonds et libres de glace)  
 Eider à duvet (au fleuve, Charlevoix et Bas-Saint-Laurent)  
 Harelde kakawi (au fleuve, Charlevoix et Bas-Saint-Laurent)  
 Goéland argenté (au fleuve)  
 Goéland marin (au fleuve)  
 Goéland arctique (au fleuve)  
 Goéland bourgmestre (au fleuve)

*Oiseaux de proie (11)*

Épervier brun  
 Épervier de Cooper  
 Autour des palombes  
 Faucon pèlerin  
 Faucon émerillon  
 Grand-duc d'Amérique  
 Hibou moyen-duc  
 Hibou petit-duc  
 Chouette rayée  
 Harfang des neiges (espaces enneigés ouverts, par exemple Saint-Vallier)  
 Pie-grièche boréale (grise) (RNF du cap Tourmente, par exemple)  
 (À noter que le Hibou des marais n'est pas vraiment présent au Québec en hiver : il se trouve un peu plus au sud.)

*«Poules» et pigeons (4)*

Perdrix grise (espaces ouverts avec «cachettes») [*Maïs concassé, graines mélangées*]  
 Gelinotte huppée [*Maïs concassé, blé, avoine*]  
 Tétras du Canada  
 Pigeon biset [*Maïs concassé, graines mélangées, tournesol noir*]

Corvidés (4)

Mésangeai du Canada

Geai bleu [*Arachides en écales, maïs concassé, tournesol noir*]

Grand Corbeau

Corneille d'Amérique [*Maïs concassé, maïs entier, suif de bœuf*]

Les Pics (3)

Pic mineur [*Suif de bœuf, pain d'oiseaux, beurre d'arachide*]

Pic chevelu [*Suif de bœuf, pain d'oiseaux, beurre d'arachide*]

Grand Pic [*Suif de bœuf, pain d'oiseaux*]

Petits oiseaux de boisés (5)

Mésange à tête noire [*Tournesol noir, suif de bœuf, arachides et noix*]

Mésange à tête brune [*Tournesol noir, suif de bœuf, beurre d'arachides*]

Sittelle à poitrine blanche [*Tournesol noir, suif de bœuf, beurre d'arachides*]

Sittelle à poitrine rousse [*Tournesol noir, suif de bœuf, beurre d'arachides*]

Grimpereau brun [*Suif de bœuf, beurre d'arachides*]

Oiseaux d'espaces ouverts (2)

Plectrophane (Bruant) des neiges [*Avoine, maïs concassé, graines mélangées*]

Alouette hausse-col [*Maïs concassé, graines mélangées*]

Les immigrés (2)

Moineau domestique [*Graines mélangées, millet blanc, tournesol noir*]

Étourneau sansonnet [*Suif de bœuf, maïs concassé, graines mélangées*]

Deux autres (2)

Jaseur boréal (arbres fruitiers)

Bec-croisé bifascié (Forêt Montmorency)

*TOTAL : 45.*

**Oiseaux observés surtout aux mangeoires**Trois espèces particulières (3)

Tourterelle triste [*Maïs concassé, tournesol noir, millet blanc*]

Bruant hudsonien [*Millet blanc, maïs concassé, graines mélangées*]  
 Cardinal rouge [*Tournesol noir, carthame, maïs concassé*]

*Fringillidés (7)*

Durbec des sapins [*Tournesol noir, tournesol rayé*]  
 Roselin pourpré [*Tournesol noir, chardon, millet blanc*]  
 Roselin familier [*Tournesol noir, tournesol rayé, colza*]  
 Sizerin flammé [*Tournesol noir, chardon, alpiste*]  
 Sizerin blanchâtre (rare; avec les Sizerins flammés)  
 Tarin des pins [*Chardon, tournesol noir*]  
 Chardonneret jaune [*Chardon, tournesol noir, alpiste*]

*TOTAL : 10.*

**Oiseaux d'hiver occasionnels**

*Fleuve ou plans d'eau (5)*

Mergule nain (À l'embouchure du Saguenay, est de Charlevoix et haute Côte-Nord)  
 Bécassine de Wilson (résurgences)  
 Bécasseau violet (côtes rocheuses, jetées, brise-lames)  
 Mouette tridactyle (estuaire et golfe)  
 Goéland à bec cerclé (encore vu en bons nombres en décembre)

*Oiseaux de proie (5)*

Faucon gerfaut  
 Chouette lapone (présente en petits nombres, certains hivers)  
 Petite Nyctale  
 Nyctale de Tengmalm  
 Épervière boréale (Chouette épervière)

*Deux Pics (2)*

Pic à dos rayé  
 Pic à dos noir

*Cas spéciaux (6)*

Mésange bicolore [*Tournesol noir, arachides, beurre d'arachides*]  
 Troglodyte des forêts  
 Merle d'Amérique

Junco ardoisé [*Millet blanc, maïs concassé, graines mélangées*]

Bec-croisé des sapins

Gros-bec errant [*Tournesol noir, tournesol rayé*]

*TOTAL : 18*

*GRAND TOTAL : 45 + 10 + 18 = 73.*